


ФИО _____

Возраст _____ ДАТА _____

ПОЛ _____

Головная боль

Локализация



22

Шкала боли



Принимаемые препараты

НПВС

Триптаны

Антидепрессанты

После приема препаратов



Когда возникла впервые

Характер боли

Наличие ауры ДА НЕТ

Что провоцирует ГБ

От чего становится легче

Фоточувствительность ДА НЕТ

Фоночувствительность ДА НЕТ

Время дня

Взаимосвязь с месячными

Уровень тревожности по спилбергеру _____

Депрессия по Беку _____

Красные флаги

- громоподобная головная боль (интенсивная ГБ с «взрывоподобным» или внезапным началом) характерна для субарахноидального кровоизлияния
- ГБ с атипичной аурой (длительность > 1 часа или с двигательной слабостью) характерна для транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инсульта
- аура без ГБ без указаний на мигрень с аурой в анамнезе может быть симптомом ТИА или инсульта
- аура, впервые возникшая у пациентки, принимающей комбинированные оральные контрацептивы, может указывать на риск возникновения инсульта
- впервые возникшая ГБ у пациента старше 50 лет может быть проявлением височного артериита или внутричерепной опухоли; внутричерепную опухоль также следует заподозрить при возникновении ГБ у детей в препубертатном периоде
- нарастающая ГБ, усиливающаяся в течение нескольких недель и более, может быть вызвана интракраниальным объемным образованием
- ГБ, усиливающиеся при изменении позы или нагрузках, повышающих внутричерепное давление (кашель, чихание, натуживание) могут быть проявлением внутричерепной опухоли
- вновь возникшая ГБ у пациента с онкологическим заболеванием, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом в анамнезе.